Problem C
Apples

問題：The hik Revolutions

解説：田村（sune2）

問題

- N個の点が等速直線運動する
  - 初期位置(xi,yi)
  - 速度(ui,vi)
- t>=0の任意の時刻，任意の直線を選んで，直線を引く
- 最適な時刻，直線を選んだときの，直線上の最大値を求めよ
- N<=200

考察

- N=1の場合答えは1, N=2の場合答えは2
- 以降N>=3の場合を考える

- 点が全く動くかないときは？
  - 解となるような直線には2点は乗っている
  - 2点を通るような直線をすべて試す
  - 2点を決めて，全ての点について直線に乗っているか調べるので，O(N^3)

- 点が動くときは2点を決めても，2点が一直線上に乗るような時間は無限に存在
- 3点を決めると，3点が一直線上に乗る時間は限られる

二次方程式

- 3点を選んだとき，3点が一直線上に並ぶ時間tを求める
- 1点を原点に固定したときの，残りの2点を以下とする
  - 初期位置p1,p2
  - 速度v1,v2
- p1+v1*tとp2+v2*tがy=ax上に乗ることから，方程式を立てて整理すると
  - (v1×v2)t^2 + (p1×v2 – p2×v1)t + p1×p2 = 0
  - “×”は外積
- この二次方程式を解くことで，tはO(1)で計算可能

考察2

- 3以上の解を達成するような点集合のパターンは以下のようになる

- (a)解に含まれる点のペアで同一点のものがある場合
  - (a1)解に含まれる全ての点が常に一致している場合
    - t=0とかで調べれば良い
  - (a2)解に含まれる点のペアで常に一致してはいないものがある場合
    - そのペアp,qが一致する時間は1回なので, その時間を調べれば良い

- (b)解に含まれる全ての点が異なる点の場合
  - (b1)解に含まれる全ての点が常に一直線上に並んでいる場合
    - t=0とかで調べれば良い
  - (b2)解に含まれる3点で常に一直線上には並んでいないものがある場合
    - その3点p,q,rが一直線上に並ぶような時間を調べれば良い

解法1 (TLE?)

- 3点を選ぶ
- 3点が一直線上に並ぶ時間t(>=0)を求める
  - tが有限個のとき
    - 時間tにおいてその直線上にある点の個数を数える
    - (b2)に対応
    - (a2)の一部もカバー
  - tが無限個のとき
    - t=0において3点が並ぶ直線上にある点の個数を数える
    - ただし3点t=0において同一点の場合は適当に直線を引く
    - (a1)，(a2)の残り，(b1)をカバー
- O(N^4)
  - TLEさせるつもりでしたがうまく書くと通るかもしれません

解法2-1

- (a1) (a2) (b1)はO(N^3)でチェックできる
  - (a1), (b1)は点が動かない場合と同様
  - (a2)は2点を選んで，その2点が一致する時間においてその点に存在するような点の数を求める
- (b2) の場合を高速にチェックしたい

解法2-2

- 2点p,qを選ぶ
  - pとqが常に等しい場合は(b2)ではないので無視
- 3点目rを選んだとき，p,q,rが一直線上に並ぶような時間の集合を$T_{p,q}(r)$と表す
  - p,q,rが常に一直線上に並ぶような場合は(b2)ではないのでやはり無視
  - p,q,rが全て異なる点ではないような時間もやはり無視

解法2-3

- $t \in T_{p,q}(r_1)$, $t \in T_{p,q}(r_2)$ のとき，何が言えるか
  - tにおいてp,q,r_1が並ぶ直線と，tにおいてp,q,r_2が並ぶ直線は等しい
  - 証明：p!=qから，p,qのみで直線が一意に定まるから
- よって，時刻tにおいてp,qによって定まる直線上にある点の個数は
  - $\#\{k \mid t \in T_{p,q}(r_k)\} + 2$
- この個数は$T_{p,q}(r_k)$に含まれるtをソートしたりmapで管理したりすることで求められる
- O(N^3 log N)

おまけ(ロバスト解)

- 二次方程式の解の形(B+√D)/A同士の<を整数演算のみで定義できると, ロバストに解くことが出来る
- 普通に(B+√D)/A< (B'+√D')/A'を以下を用いて定義することも可能だが, 小さいA,B,Dしか64bit整数で扱えない
  - 0<=x<y ⇔ x^2<y^2
  - x<y<=0 ⇔ x^2>y^2
- <を実数の<と等価なものとして定義しなくても適当な順序付けさえできればmapとかを使うときには問題ない
  - 負かどうかの判定は仕方ないので普通にやる

おまけ(ロバスト解)

- 以下の事実を用いる
  - $a+b\sqrt{c} = a'+b'\sqrt{c} \Leftrightarrow a=a' \wedge b=b'$
  - ここでcは1でないsquare-freeな整数
- $(B+\sqrt{D})/A$を$r1+r2\sqrt{k}$(k:square-free,k=1のときはk=0)に変形する
  - r1, r2はRational型で管理
- $r1+r2\sqrt{k} < r1'+r2'\sqrt{k'}$を
  - k!=k' ? k<k' : r1 != r1' ? r1<r1' : r2<r2'
  - で定義すればよい